



Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.

Fax: 2510 600430

E mail: dpyrgiotou@minagric.gr

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Γεωργιάδου, Δ. Στουγιαννίδου.

No 32/11-08-2023

ΑΜΠΕΛΙ

Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)



Με βάση τα στοιχεία που μας παρέχει το δίκτυο φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας μας, η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου συνεχίζεται με αυξημένους αριθμούς συλλήψεων σε όλες τις περιοχές. Τονίζεται και πάλι η σπουδαιότητα των προσβολών της ευδεμίδας κατά την παρούσα χρονική στιγμή όσον αφορά στην φερόμενη παραγωγή σταφυλιών. Γιατί αφενός μεν η ευδεμίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες, αφετέρου στις ράγες όπου αναπτύσσονται οι προσβολές της, κατά κανόνα αναπτύσσονται δευτερογενώς διάφορες σήψεις, με κυριότερες αυτές του βοτρώτη και της όξινης σήψης.

Στα πλαίσια αυτά και σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε με τα προηγούμενα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε η υπηρεσία μας, προτείνεται η διενέργεια επαναληπτικού ψεκασμού, στις 14-16 Αυγούστου με τη χρήση ενός κατάλληλου ωοκτόνου - εντομοκτόνου ενώ στην περίπτωση χρήσης προνυμφοκτόνου - εντομοκτόνου ο ψεκασμός συνιστάται να λάβει χώρα περί τις 2 ή 3 ημέρες αργότερα, δηλαδή ενδεικτικά, 16-19 Αυγούστου, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση, λόγω και της πολυπλοκότητας του θέματος, πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος. Ο ψεκασμός, ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής, και την διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε, δύναται να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα (κατά μέσο όρο).

Τονίζεται με έμφαση, ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών οφείλεται να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi) και έτσι συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα


μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή/και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*). Συνιστάται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*)

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού μόνο όπου σημειωθεί προσβολή.

Όξινη σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια)

Σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής και όχι προληπτικά, να διενεργείται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.



Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

- όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
- να τηρούν όσα προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση υλοποιούνται - &
- να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

dpyrgiotou@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr, dimstou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr 

Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου