

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 19

Ευδεμίδα: Έναρξη 3^η πτήσης :

- Στην όψιμη ζώνη του νησιού

Επανάληψη αντιμετώπισης για την 3^η πτήση :

- Στην πρώιμη ζώνη του νησιού
- Στην ενδιάμεση (μεταξύ πρώιμης - μεσοπρώιμης) ν. Ηρακλείου και στην κάτω Μεσαρά

Ωίδιο: Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα

Τζιτζικάκια: Αυξημένοι οι πληθυσμοί κατά θέσεις → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο

Χρόνοι εφαρμογής ψεκασμών: Συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται αργά από το σούρουπο και μετά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας

Φαινολογικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα


- Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι από το κλείσιμο έως την έναρξη ωρίμασης.
- Σε σχέση με το 2025, εμφανίζεται οψιμότητα τουλάχιστον κατά μια εβδομάδα.

Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας				
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών		Στάδιο M αρχή γυαλισματος γυάλισμα	
Κλίμακα BBCH	77		81	
Πρώιμη ζώνη			γυάλισμα σταφυλιών	
Μεσοπρώιμη		τα σταφύλια γυαλίζουν		
Όψιμη ζώνη	τα σταφύλια κλείσανε – έναρξη γυαλισματος			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:



- Έναρξη 3ης πτήσης και στις όψιμες περιοχές του νησιού.
- Η 3η πτήση είναι πλέον σε εξέλιξη σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες του νησιού (Πιν.2).
- Οι επόμενες 20-30 ημέρες (ανάλογα με τη ζώνη) είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση του εντόμου.

Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου ανά ζώνη την περίοδο αυτή

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις, ωτοκίες)	σημαντικά αυξημένη	χαμηλή αλλά σε συνεχή αύξηση	χαμηλή, έναρξη πτήσης

Οδηγίες:

- Σε αμπέλια της όψιμης ζώνης συνιστάται να ξεκινήσει αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες, ιδιαίτερα όπου η ανοχή προσβολής των σταφυλιών είναι πολύ μικρή έως μηδενική:

- Όψιμη ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου: 24 - 26 Ιουλίου

- Όψιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου: 26 - 28 Ιουλίου

- Στην πρώιμη ζώνη, στην κάτω Μεσαρά και στην ενδιάμεση (μεταξύ πρώιμης - μεσοπρώιμης) του ν. Ηρακλείου συνιστάται επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες*:

- Πρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου: 23 - 25 Ιουλίου

- Πρώιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου: 25 - 27 Ιουλίου

- Ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου και κάτω Μεσαρά: 26 - 27 Ιουλίου

Προσοχή: Οι ψεकाσμοί στοχεύουν τα σταφύλια → Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχή ώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια.

Επισήμανση: Παρά τα σχετικά μέτρια επίπεδα πληθυσμών που καταγράφηκαν κατά τη 2η πτήση (συλλήψεις ακμαίων και ωτοκίες), η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, λόγω της έντονης - συνεχούς βλάστησης των αμπελιών με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να διαπιστώνονται σημαντικές προσβολές. Στα αμπέλια όπου διαπιστώνονται προσβολές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι υπάρχοντες πληθυσμοί του εντόμου θα συμβάλουν σε αυξημένη πίεση προσβολής κατά την εξέλιξη της 3ης πτήσης → Τα κρυμμένα σταφύλια προσβάλλονται.

* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σας συνιστούμε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Τη φετινή καλλιεργητική περίοδο η πίεση προσβολής από τον μύκητα είναι πολύ ισχυρή.
- Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, άνεμοι) έχουν ευνοήσει διαδοχικούς και σύντομους κύκλους του μύκητα με αποτέλεσμα στα σταφύλια και στη βλάστηση να εμφανίζονται νέες μολύνσεις συνεχώς.
- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών όπως και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες:

- Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα και με εναλλαγή σκευασμάτων για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ :



Πτερωτό



Άπτερο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι πληθυσμοί τους στα αμπέλια έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά θέσεις.

Οδηγίες :

- Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.
Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
- Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή – πολύ ζωνή βλάστηση είναι στοιχείο που επιβαρύνει την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) : Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 22 Ιουλίου 2026

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προαιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με ακρίβεια τη γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά.).

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	

Σύνδεσμοι προς ενημέρωση...

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
<http://psekastika.minagric.gr/index.php>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
<http://ppp-usercert.minagric.gr/>

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει εβδομαδιαία δελτία άρδευσης.

Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> θα βρείτε αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον έχει εκδώσει Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες του νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση :
<https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>